AXIMAG SC

CONCIME MINERALE LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI
PFC 1(C)(I)(b)(i): MgO (33%) - in sospensione

- Magnesio micronizzato ed altamente efficace.
- Migliora la fotosintesi clorofilliana.
- Previene le carenze.

CE REG. 2019/1009

bioagricert INPUTS

CARATTERISTICHE

Applicazione sulla pianta

1,5 l/Ha Dose media d'impiego

AXIMAG SC è un concime fogliare espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenza di **Magnesio** negli ortaggi, nella frutta e nell'uva. Una carenza di magnesio nella pianta si manifesta con un ingiallimento (clorosi) delle foglie più vecchie (basali) e la loro caduta anticipata, ridotto sviluppo per scarsa fotosintesi clorofilliana, limitata colorazione degli ortaggi, ad esempio delle carote, per la mancata formazione dai pigmenti coloranti. AXIMAG SC, grazie alla purezza dei suoi componenti e alla presenza di specifici coformulanti ad azione chelante consente un più facile assorbimento e un pronto trasferimento del magnesio all'interno dei tessuti trattati. Il trasferimento e la penetrazione all'interno della pianta sono garantiti anche dall'altissima micronizzazione delle componenti minerali che porta alla formazione di particelle finissime capaci di valicare facilmente la parete fogliare ed essere poi agilmente trasportate dalla pianta. La specifica formulazione ad alto titolo in Magnesio complessato consente di: Evitare l'insorgenza di dannose fisiopatie come il Disseccamento del rachide nella vite e la filloptosi del melo. Migliorare la risposta produttiva grazie all'ottimizzazione della fotosintesi clorofilliana. Aumentare la colorazione di frutta e ortaggi. Migliorare il livello qualitativo della produzione vitivinicola. Si consiglia di utilizzare AXIMaG SC con trattamenti fogliari precoci preventivi.

COMPOSIZIONE

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE	33,0% = 480 g/l

CLASSIFICAZIONE

CLP -

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata - colore bianco

CONFEZIONI

Flaconi: L 1 = 1,4-1,5 g/mL
Tanica L 10

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

AXIMAG SC è miscibile con tutti i concimi fogliari e i fitofarmaci, previa acidificazione in botte per i prodotti a reazione acida. Evitare la combinazione con gli olii.

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE* Applicazione fogliare
VITE E UVA DA TAVOLA	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1,5-2,0 l/Ha
MELO E PERO	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1,0-2,0 l/Ha
PESCO E DRUPACEE	2-3 applicazioni da "frutto noce", ripetere ogni 8 giorni	1,0-2,0 l/Ha
ACTINIDIA, FRUTTA A GUSCIO e PIANTE DA FRUTTO IN GENERE	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1,0-2,0 l/Ha
OLIVO	2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni	1,5-2,0 l/Ha
AGRUMI	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1,0-2,0 l/Ha
COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI	1-2 applicazioni a partire dalle fasi di sviluppo	1,0-2,0 l/Ha
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA	2-3 applicazioni da ingrossamento frutti del 1° palco, ripetendo ogni 10-12 giorni	1,0-2,0 l/Ha
LATTUGHE E ORTAGGI DA FOGLIA	2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni	1,0-1,5 l/Ha
ORTAGGI IN GENERE	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1,0-1,5 l/Ha
FRAGOLE	2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni	1,0-1,2 l/Ha
ARBUSTI E VIVAISMO	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	80-100 ml/hl
FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE	1-2 applicazioni nelle fasi iniziali. Non applicare dopo la bocciolatura	70-100 ml/hl

*Riferite a volumi d'irrorazione consigliati di 1000 l/ha.

APPLICAZIONI AL TERRENO: per tutte le colture prevedere 5 L/ha da ripetere ogni 10 giorni