MEDEIRO 80 WG ADVANCE

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

- Grande mobilità del principio attivo nelle piante.
- Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento.
- Sistemia ascendente e discendente.

Applicazione sulla pianta

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

FOSETIL ALLUMINIO puro	g 80

REGISTRAZIONE

n. 15363 del 15/03/2012

CLASSIFICAZIONE

CLP	H412

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI

Kg 10

CARENZA

15 giorni su agrumi e pomacee
28 giorni su uve da vino.

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE con altri prodotti fitosanitari. Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

COLTURE	PATOGENI	DOSE	NOTE
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino,Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo,Tangelo)	Peronospora *Phytophtora spp*	250-300 g/hl d'acqua	Max 3 trattamenti per anno. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera. all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre.
VITE (da Vino)	Peronospora della vite *(Plasmopara viticola)*	250-300 g/hl d'acqua	Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
POMACEE	Peronospora *(Phytophtora infestans)*	250-300 g/hl d'acqua	Max 3 trattamenti per anno. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.