scam
NUTRIZIONE·PROTEZIONE·BIOSYSTEM

NEWFERSTIM K

NUTRIZIONE

IL PRODOTTO IDEALE PER GARANTIRE QUALITÀ ELEVATA

ALTO CONTENUTO IN AMMINOACIDI LIBERI, PEPTIDI E PROTEINE

RICERCA SCAM

FERTIRRIGANTI ORGANICI LIQUIDI

NEWFERSTIM K QUALITA' E RESA

Focus sul prodotto

NEWFERSTIM K è un concime organo-minerale liquido innovativo nel panorama della fertilizzazione. Appartiene ad una gamma di concimi appositamente studiati da SCAM per la fertirrigazione. La componente minerale prevede una specifica formulazione con potassio (K) proveniente da acetato. La frazione organica contiene 19 amminoacidi differenti, associati con la frazione minerale perfettamente solubile. Questa originale formulazione liquida garantisce praticità d'uso ed elevato assorbimento dei nutritivi rispetto ai tradizionali prodotti minerali. NEWFERSTIM K è un fertilizzante che grazie alla presenza delle pregiate componenti organiche, presenta una azione particolarmente rapida ed efficace. Per la sua studiata titolazione è ideale nelle fasi finali del ciclo colturale, migliora la qualità e quantità del prodotto raccolto sostenendo la pianta durante la fase di maturazione. Per il particolare rapporto NK è indicato anche durante il ciclo di produzione nelle piante a raccolta scalare.

Complessazione tra amminoacidi e nutrienti

Ione "nudo"
in soluzione soggetto a
"inattivazione"



Ione legato a
due molecole d'acqua:
stato di "complesso"



Ione metallico legato ad un
amminoacido in forma anionica:
stato di complesso "chelato"



analogia con le
chele del granchio

Esperienze in campo

Uva da tavola Sicilia

L'utilizzo del prodotto in fertirrigazione ha permesso di aumentare il grado Brix su vite da tavola varietà Vittoria. Newferstim K ha un efficacia maggiore rispetto ai comuni Sali di potassio, questo consente di mantenere bassa la conducibilità della soluzione circolante anche in condizioni di acque molto saline.



NUTRIZIONE

Esperienze in campo

Pomodoro Piacenza

L'utilizzo del prodotto in fertirrigazione ha permesso di aumentare la percentuale di pomodori rossi su pomodoro. La combinazione stimolante e nutriente di Newfertstim K mette in condizioni la pianta di maturare una quantità maggiore di bacche.



Kiwi Latina

L'utilizzo di newfertstim k durante le fasi di maturazione del kiwi consente di aumentare la sostanza secca e zuccherina nel frutto.



Il prodotto risulta performante anche nei casi più difficili in cui stress ambientali e produzioni elevate rendono poco efficace l'utilizzo dei normali sali di potassio.

NUTRIZIONE

NEWFERSTIM K

CONCIME ORGANO-MINERALE NK
in sospensione
PER FERTIRRIGAZIONE

- Supporta la pianta durante la fase di maturazione dei frutti
- Incrementa la produzione in qualità e quantità
- Trasporta le sostanze nutritive direttamente nel luogo di consumo (CARRIER)

10-20 kg/Ha Dose media d'impiego

Fertirrigazione

Applicazione sulla pianta

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale di cui: organico 1%, ureico 2%,	3,0%
OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) idrosolubile	15,0%
FERRO (Fe) solubile in acqua di cui chelato con EDTA 0,5%	0,5%
MANGANESE (Mn) solubile in acqua di cui chelato con EDTA 0,5%	0,5%
CARBONIO (C) organico	3,0%

CLASSIFICAZIONE

CLP -

COMPONENTI ORGANICHE
Epitelio animale idrolizzato

COMPONENTI MINERALI
Sale grezzo di potassio

FORMULAZIONE
Fluido in sospensione

CONFEZIONI
Tanica: kg 25 = 20L
kg 1100

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata. In caso di applicazioni fogliari non miscelare a formulati a base di rame, zolfo, oli minerali, insetticidi a base oleosa e Fosetyl-Al, mantenere distanziati di almeno 8 giorni. In floricoltura non applicare con petali visibili

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE Applicazioni per fertirrigazione (manichetta, micro jet, etc.)	DOSE Applicazione fogliare
VITE E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE	2-3 applicazioni, da ingrossamento frutti a maturazione di raccolta raggiunta	8 - 15 kg/Ha	**Vite e piante da frutto:** 1,5 – 2,5 kg/ha *(usare la dose più bassa per nettarine, kiwi e mele varietà Golden e simili).* **Ortaggi in genere:** 1,5 – 2 kg/ha
ACTINIDIA	3-5 applicazioni da ingrossamento frutti a maturazione di raccolta raggiunta	10-15 kg/ha	
FRAGOLA	3-5 applicazioni dall'ingrossamento dei primi frutti e durante le raccolte scalari	10-15 kg/ha	
AGRUMI	2-3 applicazioni da ingrossamento frutti a maturazione di raccolta raggiunta	15-20 kg/ha	
PATATA	2-3 applicazioni durante le fasi di accrescimento del tubero	15-20 kg/ha	
POMODORO, MELONE, ZUCCHINO E ALTRI ORTAGGI A FRUTTO	2-3 applicazioni, da ingrossamento frutti a maturazione di raccolta raggiunta	25 kg/ha	
RADICCHIO LATTUGA E ORTAGGI DA FOGLIA	2-3 applicazioni, nelle fasi finali	2-4 kg/1000 mq	
POINSETTIA, ORNAMENTALI E VIVAISMO	3-4 applicazioni, dalle fasi finali	2-3 kg/1000 mq	

scam NUTRIZIONE·PROTEZIONE·BIOSYSTEM

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164
41126 Modena (ITALIA) - Tel. +39 059 586511 info@scam.it - **www.scam.it**