IDROCOMPLEX NEW ARANCIO

CONCIME MINERALE SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI
PFC 1 (C)(I)(a)(ii) - Concime NPK (MgO) (SO3) con B + Cu + Fe + Mn + Zn
15.5.30 (2)(24) + 0,01 + 0,01 + 0,12 + 0,01 + 0,12

- Specifico contenuto NPK per applicazioni nelle **fasi intermedie e finali** delle colture.
- Migliora la **pezzatura** e il risultato finale della produzione.

Fertirrigazione

8-120 kg/Ha Dose media d'impiego

CARATTERISTICHE

IDROCOMPLEX NEW ARANCIO è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi totalmente solubile in acqua. Per il suo specifico **contenuto NPK** si presta per applicazioni nelle fasi intermedie e finali delle colture. Arricchito con specifici microelementi per favorire i processi biochimici della pianta.

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale di cui: ammoniacale 3,6%, nitrico 8,8%, ureico 2,6%	15,0%
ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) idrosolubile	5,0%
OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) idrosolubile	30,0%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) idrosolubile	2,0%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO_3) idrosolubile	13,0%
BORO (B) nella forma di acido borico, idrosolubile	0,01%
RAME (Cu) nella forma di rame EDTA, idrosolubile	0,01%
FERRO (Fe) nella forma di ferro EDTA, idrosolubile	0,12%
MANGANESE (Mn) nella forma di manganese EDTA, idrosolubile	0,01%
ZINCO (Zn) nella forma di zinco EDTA, idrosolubile	0,12%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 Kg

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP -

COLTURE, PERIODO APPLICAZIONE, DOSE, NOTE

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE	NOTE
PIANTE DA FRUTTO, VITE, ARBOREE	Intermedio / finale	80-120 kg/Ha	Frazionare la dose totale indicata con applicazioni ogni 7-14 giorni, o più, secondo le esigenze. Nella soluzione che raggiunge le colture la concentrazione di prodotto è bene che in genere non superi il 2‰, facendo attenzione a programmare concentrazioni diverse secondo la sensibilità alla salinità delle varie colture. È buona norma sciogliere non più di 10 kg di prodotto per ogni 100 litri di acqua.
ORTAGGI	Intermedio / finale	9-12 kg/1000 mq	
FLORICOLTURA, VIVAISMO	Intermedio / finale	7-10 kg/1000 mq	